



Retours d'utilisation de l'outil « PMSA-Réseaux »

➤ **15 réseaux participant à l'étude**


→ 6 réseaux médicalisés et 9 réseaux non-médicalisés

- RESPA de la Loire à la Vie – Pays de la Loire
- Réseau Alsace Gériatrie - Alsace
- Réseau de santé Arduinn'âge – Champagne Ardennes
- AG3C – Haute Normandie
- Réseau Gériatrie Limoux-Quillan – Languedoc Roussillon
- Réseau de Santé Paris Nord – Ile de France
- Réseau Lille Hellemmes Lomme – Nord Pas de Calais
- Réseau Gériatrie Bisontin - Franche Comté
- Réseau Gériatrie Gérard CUNY – Lorraine
- Plateforme Santé EOLLIS - Nord Pas de Calais
- Réseau gériatrie Eollis – Nord Pas de Calais
- Réseau de santé Paris Nord – Ile de France
- Réseau de Santé Gériatrie du Conflent – Languedoc-Roussillon
- Réseau gériatrie Espace Seniors Baume les Dames – Franche-Comté
- Réseau gériatrie bisontin – Franche-Comté

➤ **Utilisation de l'outil entre avril 2013 à avril 2014**

➤ **203 dossiers « PMSA-Réseaux » complétés**

➤ **154 dossiers « PMSA-Réseaux » complétés suivant le schéma 1 :**




➤ **Temps moyen pour compléter l'outil – 2 fiches : 12 min**

➤ **Professionnels du réseau utilisant l'outil selon le schéma 1 :**

- IDE coordinatrices
- Médecins coordonnateurs
- Kinésithérapeutes
- Coordinatrices

➤ 49 dossiers « PMSA-Réseaux » suivant le schéma 2 :



- **Temps moyen pour compléter l'outil – 4 fiches : 27min**

- **Professionnels du réseau utilisant l'outil selon le schéma 2 :**
 - IDE coordinatrices
 - Médecins coordonnateurs
 - Internes en médecine

Fiche n° 1 : ALERTE

Critères d'alerte prédictifs d'un trouble de l'observance du traitement

Critères MAJEURS

➤ **En moyenne : 1,7 critères majeurs cochés / 6**

- Refus du traitement
- Présence de médicaments périmés
- Stock de médicaments non proportionné à la prescription
- Ecart médicaments prescrits / pris
- Mésusage de l'alcool
- Plusieurs génériques pour une DCI

Fiche n° 1 : ALERTE

Critères d'alerte prédictifs d'un trouble de l'observance du traitement

Critères MINEURS

➤ En moyenne : 3,2 critères mineurs cochés / 8

- IADL altérés
- Troubles visuels
- Troubles cognitifs (ex : MMS < 25)
- Incapacités physiques
- Isolement
- Sortie d'hospitalisation récente
- Précarité financière
- Pas d'aide humaine à l'administration du traitement

Fiche n° 1 : ALERTE

Critères d'alerte prédictifs d'effets négatifs liés aux médicaments – **risque iatrogénique**

Critères MAJEURS

- Prise de médicaments « cibles »*
- Situations à risque *
- Perte de poids non justifiée

* cf. fiche n°3

➤ **En moyenne : 1,8 critères
majeurs cochés / 3**

Fiche n° 1 : ALERTE

Critères d'alerte prédictifs d'effets négatifs liés aux médicaments – **risque iatrogénique**

Critères MINEURS

- Prise d'au moins 6 médicaments
- Polypathologie complexe
- Insuffisance rénale
- Chute dans les 6 derniers mois
- Comportement inhabituel / bizarre
- Prescription ressentie comme inadaptée par le patient
- Modification récente du traitement
- Existence de plusieurs ordonnances différentes

➤ **En moyenne : 3,1 critères mineurs cochés / 8**

➤ Les réseaux partagent la synthèse-conclusion de l'outil avec :

- 14 : Médecin traitant
- 11 : Entourage
- 11 : Le patient
- 13 : IDE libéral
- 4 : Centre mémoire
- 7 : En interne
- 6: Hôpital de jour
- 6 : Autres professionnels intervenant/acteurs de la coordination
- 3 : Pharmacien



**Merci aux réseaux
pour ces retours !**

Contact :
docteur@reseaugcuny.fr